

Anexos

Anexo 1. Entrevista semiestructurada abierta inicial al director de la fundación

1. ¿Cómo empezó la fundación y cuántos años tiene?
2. ¿Cómo es la estructura organizacional de la fundación?
3. ¿Cuál cree usted que es el mayor conflicto?
4. ¿Todos entran con revisión psiquiátrica o psicológica?
5. ¿Por qué y para qué se utilizan las esposas?

Anexo 2. Encuesta estructurada semi-abierta inicial para los participantes

Nombre: _____ Edad: _____

¿Has hecho ejercicios teatrales alguna vez? SI () NO ()

¿Hace cuanto?, Describa brevemente su experiencia, si la tiene:

Para usted, ¿qué es el teatro foro?:

¿Te afecta fácilmente lo que otros sienten o digan? SI () NO ()

¿Tomas medicamentos? SI () NO ()

¿Cuáles? _____

Anexo 3. Entrevista semiestructurada abierta final para los participantes

1. ¿Cuáles fueron tus expectativas iniciales y con qué te encontraste?
2. ¿En qué momento del laboratorio fuiste más feliz?
3. ¿Cuáles fueron los juegos o ejercicios que más te gustaron y por qué?
4. ¿Cuáles fueron los juegos o ejercicios que representaron un reto para ti y por qué?
5. ¿Qué fue para ti el laboratorio, y qué te llevas?

Anexo 4. Algunos datos arrojados de la encuesta

Nombre	Edad	Toma medicamentos	Tiempo en la fundación	Te afecta lo que otros hagan o digan
MUJERES				
Rosa F. Delgado	67	NO	3 meses	SI
Luz Edilia Escobar	41	SI	3 meses	SI
Derly Johanna Chacon	40	SI	1 mes	NO
Vicky Liliana Campo	32	NO	1 año	NO
Maria Patiño	38	SI	15 días	SI
Jessica Paola Sandoval	30	SI	11 meses	NO
Yurani Vannesa Lopez	26	SI	9 meses	NO
Loren Dayana Cano C.	25	SI	25 Días	SI
Evelin Vannessa Preciado	21	SI	2 m. y 8 días	NO
María F. Angulo Hurtado	21	SI	3 meses	NO
Luz Marina	14	SI	4 meses	NO
HOMBRES				
Jairo Ibarro	63	NO	10 meses	NO
Teodoro Cortes	57	SI	1 semana	SI
Oscar Ariel Navarro	54	NO	2 m. y 15d.	NO
Oster Man	51	SI	8 meses 8 días	SI y NO
Refael Arteaga	51	SI	1 mes y 20 días	NO
Jaime Rocha	48	NO	1 Mes	NO
Edwin Alexander	46	SI	15 días	NO
Luis Alberto Ortiz	43	SI	1 año	SI
Cesar A. Caicedo González	41	SI	2Años y 3 m.	NO
Ricardo A. Valencia.	39	SI	6 meses, 8 días	NO
Fider Muñoz Ojeda	38	SI	11 meses	NO
John Jairo Villeda M.	38	SI	2 años	SI
Manuel Conde	35	SI	1 año	SI
Jaime Alegría	34	NO	15 días	NO
Kevin	30	NO	9 m. 28 d.	NO
Alexander García	28	NO	1 mes	NO
Jaime Julián Gonzales	28	SI	3 días	NO
Rubén Darío Flórez	27	SI	2 meses 8 días	NO
Juan Manuel	26	NO	5 meses	NO
Andres Felipe Ortiz	26	SI	8 meses	NO
Nicolas Florez Martinez	26	NO	Mes y medio	NO
Harold M. Vera Luna	26	NO	3 años y 6 m.	NO
Bayron Garcia Cano	25	SI	2 días	DEPENDE.
Miguel Angel Ramirez	25	SI	10 meses	NO
Juan David Castro Rojas	24	NO	23 días	NO
Juan David Valencia P	22	SI	3 meses	SI
Luis Angel Ramos	21	NO	1 m. y 7 d.	NO
Kevin Aguilar Mina	18	SI	1m. y 29d.	NO

Elaboración Propia

Anexo 5. Medicamentos, funciones principales y número de personas que lo toman

Medicamento	Función	# hombres que lo toman	# mujeres que lo toman
Losartán	Controla la presión arterial.	1	-
Quetiapina A. A.	Controla la esquizofrenia	2	-
Clorotiazida	trata el edema y la retención de líquidos	1	-
Atorvastatina	Reduce el riesgo de Infarto	1	-
Alopurinol	Reduce ácido Úrico (ataques de gota y cálculos Renales)	1	-
Ácido Valproico	Para regular las emociones Para tratar ciertos tipos de convulsiones	6	2
Trazodona	Se usa para tratar la depresión, aumenta los niveles de serotonina	1	4
Sertralina	trata la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, los ataques de pánico, el trastorno de estrés postraumático	5	1
Clozapina	controla la esquizofrenia	6	2
Levomepromazina	Antipsicótico clásico reductor de la ansiedad Fuerte inductor del sueño	5	2
Valcote	Trata episodios maníacos agudos o mixtos asociados con TAB, con o sin características psicóticas.	2	-
Levetiracetam	para controlar las crisis convulsivas de inicio parcial	1	-
Olanzapina	tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar	1	-
Risperidona	tratar los síntomas de psicosis	4	2
Biperideno	Agente anti parkinsoniano. También está indicado en la prevención y corrección de los síntomas extrapiramidales inducidos por neurolépticos	1	-
Haloperidol	se usa para tratar trastornos psicóticos	1	-

Elaboración Propia

Anexo 6. Efectos adversos de los medicamentos que los participantes ingieren.

Medicamento	Su Tipo	Efectos Adversos
Quetiapina	Antipsicótico Atípico	Aumento de peso, mareos, movimientos musculares anormales. Estos incluyen dificultad para iniciar los movimientos musculares, temblor, sensación de inquietud o rigidez muscular sin dolor. Sentirse irritado. Trastorno en el habla y en el lenguaje. Taquicardias, entre otros...
Ácido Valproico	Anticonvulsivo ER	Somnolencia, mareos, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, Cambios en el apetito, cambios en el peso, dolor de espalda.
Trazodona	Antidepresivo	Somnolencia, mareo, náusea y dolor de cabeza, síndrome sensorial tardío, entre otros...
Sertralina	Antidepresivo SSRI	Agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración, confusión, ritmo cardíaco rápido, temblores, espasmos o rigidez muscular intensa, pérdida de coordinación, náusea, vómitos o diarrea. Dolor de cabeza, debilidad, inestabilidad, confusión o problemas de memoria. Sarpullido. urticaria
Clozapina	Antipsicótico Atípico	Resequedad de boca, estreñimiento, problemas de acomodación ocular. Somnolencia, astenia, hipotensión a dosis altas, síndrome neuroléptico.
Levomepromazina	Fenotiazinas Antipsicótica	Debilidad, inestabilidad al caminar, mareos. Confusión. Irritabilidad. Agresión. Dolor de cabeza. Pérdida de apetito
Valcote	Anticonvulsivo	Somnolencia, mareos, dolor de cabeza, diarrea, estreñimiento, Cambios en el apetito, cambios en el peso, dolor de espalda.
Levetiracetam	Anticonvulsivo	
Olanzapina	Antipsicótico Atípico	Somnolencia, cansancio, aumento de peso, aumento del apetito, presión arterial baja, mareos, rigidez muscular, agitación, estreñimiento, boca seca, y temblores o estremecimientos, entre otros...
Risperidona	Antipsicótico Atípico	Mareo, aturdimiento y desmayo cuando se levanta muy rápido al estar acostado. Aumento de peso, entre otros...
Biperideno	Anticolinérgico	Cansancio, mareos y obnubilación; cuando se aplican dosis más elevadas, se observa agitación, confusión y trastornos ocasionales de la memoria, así como, en raros casos, alucinaciones.
Haloperidol	Antipsicótico típico o Clásico	puede causar problemas de corazón, problemas a la hora de controlar los movimientos del cuerpo o las extremidades, y un efecto adverso grave denominado «síndrome neuroléptico maligno»

Elaboración Propia